



# Grandes Cultures

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 7 du 21 mars 2000 - 2 pages Numéro ordre postal : 13

### Colza

STADES : boutons cachés (D1) à boutons écartés (E). Quelques fleurs commencent à être visibles.

### Ravageurs

Quelques charançons de la tige sont encore piégés mais à ce stade d'élongation de la culture (tige > 20 cm), l'incidence des piqûres est minime. Les méligèthes sont toujours très actifs, et les captures sur certains sites atteignent des niveaux très très élevés (voir carte), et rarement constatés dans la région. Si l'on compare sur un graphique (page suivante) avec les 2 précédentes campagnes, sur des sites où les méligèthes sont fréquents, on voit bien le développement plus important depuis 2 ans de ce ravageur. Les infestations sur boutons restent cependant variables d'une situation à l'autre (traitement réalisé ou non, et à quelle date) et à l'intérieur d'une même parcelle (pieds indemnes et d'autres avec 2-3 méligèthes). En moyenne, les niveaux d'attaque ont peu évolué depuis la semaine dernière (de 0 à 1 méligèthe par pied) sauf dans le centre Seine et Marne où l'on peut atteindre 2 à 3 insectes / plante (Chatelet en Brie, Chaumes en Brie, Rozay, Bray / Seine...) et dans le secteur de La Ferté Allais (91).

**Surveillez les parcelles non traitées où ayant reçu un insecticide, il y a plus de 10 jours.**

**Seuils d'intervention :**

**1 méligèthe / plante à D1**

**2 à 3 méligèthes / plante à E**

**Attention en cas d'utilisation de parathion, ne pas intervenir si des fleurs sont présentes.**

### Blé

STADES : épi 0.5 à 1 cm

### Piétin verse

Nous avons réalisés des notations sur des parcelles de notre réseau d'observation. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Les niveaux d'attaque sont un peu inférieurs à ceux de l'an dernier au même stade. Cela s'explique par le fait que lors de la dernière campagne, les contaminations graves ont surtout été enregistrées en décembre et janvier, alors que cette année c'est au mois de février. Il y a donc encore de la maladie en incubation, qui sortira dans les semaines à venir. Les symptômes de rhizoctone sont rares (0 à 5% en général).

Bien entendu, les fréquences d'attaque piétin les plus importantes se rencontrent en blé sur blé (voir tableau ci dessous).

*Niveau de pieds touchés par le piétin  
parcelles réseau SPV*

précédent	nbre sites	moyenne	mini-maxi
blé	11	29%	8 - 55%
pois-féverole	11	13%	0 - 48%
colza	6	12%	0 - 40%
betteraves	4	6%	0 - 15%
tournesol	4	7%	0 - 10%
maïs	2	0%	-

**Si un traitement est nécessaire (seuil de 20% de pieds atteint, parcelles à fort risque agronomique), une intervention est conseillée :**

**- à partir du stade épi 1 cm pour les produits à base de prochloraz (et à 1 noeud au plus tard),**

**- autour du stade 1 noeud, pour les produits à base de cyprodinil.**

### Maladies foliaires

Situation stable et voisine de l'an passé à la même époque pour la septoriose. L'oïdium est toujours rare.

### Observations

Si vous souhaitez nous faire part de vos observations, contactez nous.

### Colza

Méligèthes à surveiller.

### Blé

Situation piétin.

Service Régional de la  
Protection des  
Végétaux  
ILE DE FRANCE  
10 rue du seminaire  
94516 RUNGIS cedex  
Tél : 01-41-73-48-00  
Fax : 01-41-73-48-48

Imprimé à la station  
D'Alertes  
Agricoles de Rungis  
Directeur gérant :  
J. BOULUD

Publication périodique  
C.P.P.A.P.  
n°0904 B 00536  
ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 360 F  
Fax 435 F



4- To - 48744 D3

749

# Pois

## Ravageurs

Surveillez les thrips dès la levée, surtout dans les secteurs habituellement concernés par ce ravageur (sud Essonne et sud Seine et Marne).

*Seuil d'intervention : 1 thrips par pied.*

THRIPS : taille réelle 1 à 2 mm



# Orge hiver

## Maladies


L'helminthosporiose est déjà présente. On peut aussi trouver de la rouille naine (ESTEREL) et de la rhynchosporiose (MAJESTIC).

*Pas d'intervention dans l'immédiat.*

**Vos pulvérisateurs vont être utilisés à de nombreuses reprises.**

**Avez vous vérifié l'état de vos buses ?**

## Captures de méligèthes



Moyennes de 6 postes : Vert le grand (91) - Maisse (91) - Château landon (77) - Le Chatelet (77) - Jouy le chatel (77) - Maisoncelles en Brie (77)

## CAPTURES DES MELIGETHES DU 15 AU 21 MARS 2000

